



Антибиотик широкого спектра действия

АВИМЕЦИН

Антибактериальное лекарственное средство в 1 мл в качестве действующего вещества содержит 100 мг азитромицина (в форме дигидрата), а также вспомогательные компоненты: 110 мг пропиленгликоля, 35 мг цитрата натрия, 10 мг бензилового спирта, лимонной кислоты до pH=5,8; воду для инъекций до 1 мл.

ФАРМОКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Азитромицин, входящий в состав «Авимецин», относится к антибиотикам группы макролидов, подгруппы азалидов. Обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, анаэробных бактерий, таких как *Actinobacillus lignieresii*, *Haemophilus spp*, *Moraxella spp*, *Bordetella spp*, *Campylobacter spp*, *Legionella pneumophila*, *Salmonella spp*, *Escherichia spp*, *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium spp*, *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, микоплазмы (*Mycoplasma pneumoniae*), спирохеты (*Borrelia spp.*). Азитромицин проявляет постантибиотический эффект – персистирующее ингибирование жизнедеятельности бактерий после их кратковременного контакта с антибактериальным препаратом. За счет этого общее антибактериальное действие препарата усиливается и пролонгируется, сохраняясь в течение срока, необходимого для ресинтеза новых функциональных белков микробной клетки. «Авимецин» хорошо всасывается и быстро распределяется в тканях организма, достигая высоких концентраций, во много раз превышающих концентрацию в плазме крови. По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007–76).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Авимецин» назначают КРС и МРС, свиньям для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, а также инфекций кожи и мягких тканей, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к азитромицину, для терапии некробактериоза, рожи свиней, спирохетоза и микоплазменных инфекций.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Авимецин» применяют животным инъекционно путем введения в шею в следующей дозировке: 1 мл/10 кг веса тела (2.5 мг азитромицина/кг веса тела). Однократно. Перед применением тщательно встряхнуть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат не рекомендуется использовать в случае гиперчувствительности целевых животных к макролидным антибиотикам.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Убой на мясо КРС и свиней разрешается не ранее, чем через 40 суток после последнего применения препарата, для мелкого рогатого скота срок составляет 35 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 3 года с даты производства, после открытия – не более 28 дней. Хранят препарат в закрытой упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Эффективен против всех
инфекционных заболеваний

МАРБОВИТРИЛ 100

Инъекционный раствор марбофлоксацина в качестве действующего вещества в 1 мл содержит марбофлоксацин – 100 мг, а также вспомогательные компоненты: фенилкарбинол – 10 мг, динатриевый этилендиаминтетраацетат – 0,1 мг, пропиленгликоль – до 1мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальное средство.

Марбофлоксацин – соединение группы фторхинолонов, обладающее широким спектром антимикробного действия в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Механизм действия заключается в ингибировании синтеза ДНК бактерий. Он эффективен в отношении широкого диапазона грамположительных бактерий (особенно *Staphylococcus*) и грамотрицательных бактерий (*Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica* и *Actinobacillus pleuropneumoniae*), а также микоплазмы (*Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma hyorheumoniae*). Может наступить устойчивость к *Streptococcus*. После введения крупному рогатому скоту или свиньям марбофлоксацин быстро всасывается и достигает максимальной концентрации в плазме меньше чем за 1 час. Его биодоступность близка к 100 %.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

“Марбовитрил 100” применяют крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, козам и сельскохозяйственной птице для лечения

маститы, метрита, воспаления копыт, гнойных бактериальных инфекций, сальмонеллеза, пастереллеза, белой водянистой диареи, вызванной *E.coli*, синдрома опухшей головы, у молодых животных – пневмонии, энтерита, диареи. Эффективно предотвращает вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

“Марбовитрил 100” – раствор для инъекций, вводится подкожно или внутримышечно, применяется в течение 3–5 дней.

Крупному рогатому скоту и свиньям: 1 мл препарата на 40–60 кг живого веса тела в день; овцам и козам: 1 мл препарата на 40–48 кг живого веса тела в день; сельскохозяйственной птице: 1 мл препарата на 20 кг живого веса тела в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная гиперчувствительность к марбофлоксацину. При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений не наблюдается.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 6 суток после последнего введения препарата для телят и молодого скота и 4 суток для свиней, молоко не ранее 36 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 2 года с момента изготовления. После вскрытия флакона не более 30 дней. Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 100 мл.



Антибиотик широкого спектра действия

ОКСИТЕТРАЦИКЛИН ЛА

«Окситетрациклин ЛА» относится к группе комбинированных антибактериальных лекарственных средств, содержащий в 1 мл в качестве действующего вещества окситетрациклин дигидрат – 200 мг и кетопрофен – 30 мг, а также вспомогательные вещества. Представляет собой стерильную водную суспензию для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Окситетрациклин является антибиотиком широкого спектра действия и обладает бактериостатическим эффектом по отношению к ряду грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Pasteurella* spp., *Actinomyces* spp., *Brucella* spp., *Bordetella* spp., *Bartonella* spp., *Haemophilus* spp., *Pasterella multocida*, *Shigella* spp. и *Yersinia* spp, а также к большинству микоплазм, спирохет, хламидий, риккетсий и некоторых грибов и вирусов.

Кетопрофен, входящий в состав препарата, является нестероидным противовоспалительным средством, обладающим ярко выраженным обезболивающим и жаропонижающим действием. Болеутоляющие свойства кетопрофена объясняются его влиянием на центральную и периферическую нервную систему, подавление действие брадикинина, вазодилатора и медиатора боли. После однократной инъекции максимальная концентрация кетопрофена в плазме крови животного отмечается менее чем через 1 час.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Окситетрациклин ЛА» назначают с/х животным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания,

мочеполовой системы и кожи, которые вызваны чувствительными к окситетрациклину микроорганизмами, таких как пневмония, бронхит, бронхопневмония, энтерит, сальмонеллез, эндометрит, синдром ММА (метрит–мастит–агалактия).

Препарат эффективен при лечении воспалительных процессов, вызванных острыми и хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, вывихи, отеки, травмы), болевого синдрома различной этиологии (травматическая и послеоперационная боль, колики), в качестве жаропонижающего средства у КРС, свиней и спортивных лошадей.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Однократная инъекция в дозе 1 мл на 10 кг массы тела, но не более 10 мл для КРС и 5 мл для свиней и МРС. При необходимости повторное применение препарата назначают через 48 часов после первого применения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять препарат при повышенной чувствительности животного к кетопрофену или тетрациклинами в сочетании с другими антибактериальными средствами.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо – 21 сутки, молоко – 7 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 2 года. Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, при комнатной температуре (25°C).

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Комплексный антибактериальный препарат

АМОГЕН

Антибактериальное лекарственное средство, в 1 мл в качестве действующего вещества содержит 150 мг амоксициллина тригидрата, гентамицина сульфат 40 мг, а также вспомогательные компоненты до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинация амоксициллина с гентамицином обладает мощным синергидным действием. Амоксициллин оказывает бактерицидное действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, ингибирует синтез бактериальной клеточной оболочки. Гентамицин является наиболее активным аминогликозидом с широким спектром и быстрым бактерицидным действием. Он препятствует синтезу протеинов в бактериальной клетке. Оба антибиотика действуют последовательно на разные стадии развития бактерии, усиливая действие друг друга. Кроме того, амоксициллин, нарушает клеточную стенку, способствуя этим проникновению гентамицина в бактерии, многократно усиливая бактерицидный эффект.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Амоген» назначают с лечебной целью лошадям, крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, собакам и кошкам при

инфекционных болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, в том числе при некробактериозе, пупочном сепсисе, атрофическом рините свиней, синдроме мастит-метрит-агалактии и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к пенициллинам и аминогликозидам.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутримышечных инъекций. Ввести 1 мл/10 кг веса тела/день 1 раз в сутки в течение 3 дней. При введении больших объемов, например скоту, необходимо ввести объем в два места, чтобы улучшить абсорбцию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать при гиперчувствительности животных к ингредиентам. Только для ветеринарного использования.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо: 30 дней. Молоко: 2 дня (4 дойки).

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы объемом 100 мл.



Антибиотик широкого спектра действия

АМОКСИ LA

«Амокси LA» – инъекционный раствор амоксициллина пролонгированного действия, содержащий в качестве действующего вещества тригидрат амоксициллина – 20 % (200 мг амоксициллина в 1 мл раствора) и вспомогательные компоненты: спирт бензиловый – 0,3 мл, бутилгидрокситолуен – 0,4 г и миндальное масло – до 100 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, является полусинтетическим антибиотиком пенициллинового ряда и обладает широким спектром антимикробного действия; активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathie*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*, *Listeria monocytogenes*, *Actinobacillus* spp., *Fusobacterium* spp., *Proteus mirabilis*, *Leptospira* spp *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Shigella* spp., *Klebsiella* spp. Максимальная концентрация антибиотика в крови отмечается через 2 часа и сохраняется на терапевтическом уровне не менее 48 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Назначают свиньям, КРС, телятам, овцам и козам при лечении инфекций, поражающих органы дыхания (включая пневмонии и бронхопневмонии у молодняка), желудочно-кишечного тракта (включая энтериты), мочеполовой системы (включая циститы и метриты), болезнях суставов, мягких тканей, кожи, атрофическом рините и синдрома мастит-метрит-агалактия, а также для профилактики послеоперационных инфекций.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Амокси LA» применяют животным однократно внутримышечно или подкожно в дозе 1 мл на 20 кг массы животного. Максимальный объем суспензии для введения в одно место не должен превышать 20 мл. При необходимости препарат вводят повторно через 48 часов. Перед применением содержимое флакона необходимо тщательно встряхнуть до получения однородной суспензии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к антибиотикам пенициллиновой группы и развитии аллергических реакций использование препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего применения препарата. Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее, чем через 72 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 2 года с момента изготовления, после вскрытия флакона – не более 28 суток.
Хранить в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 8°C до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

ВИМЕЦЕФ 250

«Вимецеф 250» – антибактериальный лекарственный препарат широкого спектра действия. В 1 мл в качестве действующего вещества содержит цефкином (в форме сульфата) – 25 мг, а так же вспомогательные вещества. Представляет собой стерильную суспензию для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальный препарат.

Цефкином, входящий в состав препарата – это цефалоспориин четвертого поколения широкого спектра действия, который действует путем подавления синтеза клеточной стенки.

Препарат отличается высокой стабильностью против пенициллиназ и бета-лактамаз, активен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включающих *Escherichia coli*, *Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Serratia marcescens*, *Haemophilus somnus*, *Arcanobacterium pyrogenes*, *Bacillus* spp., *Corynebacterium* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacteroides* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp., *Prevotellis* spp., *Actinobacillus* spp. и *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Вимецеф 250» назначают для лечения бактериальных инфекций у крупного рогатого скота, вызванных грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами, чувствительными к цефкиному. КРС: респираторные заболевания, вызванные *Pasteurella multocida* и *Mannheimia haemolytica*; дерматит, инфекционный яремный некроз и острый некробактериоз; острый мастит, вызванный *E.coli*. Телята: септицемия, вызван-

ная *E.coli*. Свиньи: бактериальные инфекции легких и дыхательных путей, вызванных *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* и другими организмами, чувствительными к цефкиному. Синдром Мастит–Метрит–Агалактия (ММА) с *E.coli*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. и другими организмами, чувствительными к цефкиному. Поросята: снижение смертности при менингите, вызванном *Streptococcus suis*. Для лечения артрита, вызванного *Streptococcus* spp., *E.coli* и другими организмами, чувствительными к цефкиному. Эпидермиты (или умеренные высыпания), вызванные *Staphylococcus hyicus*.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутримышечно. Многократное введение. Перед применением тщательно встряхнуть.

КРС: 1 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 3–5 дней. Телята: 1 мл на 12.5 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней. Свиньи: 1–2 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней. Поросята: 1–2 мл на 25 кг живого веса один раз в день в течение 5 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать при гиперчувствительности к β -лактамам антибиотикам.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо: КРС – 5 дней, свиньи – 3 дня. Молоко: 24 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 2 года с даты производства. После вскрытия флакона – 28 дней, в холодильнике.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы по 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Антибактериальный препарат широкого спектра действия

ЦЕФИ ЛА 100

«Цефти Ла 100» – антибактериальный лекарственный препарат для лечения крупного рогатого скота и свиней при заболеваниях бактериальной этиологии. В качестве действующего вещества в своем составе содержит: цефтриофур (в форме кристаллической свободной цефтриофуровой кислоты) – 100 мг, а так же вспомогательные вещества.

«Цефти Ла 100» представляет собой суспензию от серо-белого до серо-коричневого цвета. При длительном хранении возможно ее расслоение, которое исчезает при встряхивании.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат относится к антибактериальным лекарственным средствам группы цефалоспоринов третьего поколения.

Цефтриофур, входящий в состав препарата, активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы, продуцирующие бета-лактамазу. Механизм бактерицидного действия цефтриофура заключается в подавлении синтеза клеточной стенки бактерий.

После парентерального введения препарата цефтриофур быстро резорбируется с места инъекции и метаболизируется с образованием дефуоилцефтриофура, который обладает эквивалентной цефтриофур антибактериальной активностью, обратимо связывается с белками плазмы и концентрируется в местах воспаления. Связывание с белками цефтриофура и его основного метаболита составляет примерно 70%. Максимальная концентрация антибиотика в плазме крови достигается примерно через 22 часа после введения и сохраняется на терапевтическом уровне не менее 7 суток. Выводится цефтриофур из организма, главным образом, с мочой (около 60 %) и частично с фекалиями (около 15 % от введенной дозы) в течение 10 суток после введения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Цефти Ла 100» применяют для лечения крупного рогатого скота и свиней при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, некробактериозе, послеродовом эндометрите (метрите), мастите, метрит-мастит-агалактии и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к цефтриофур.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Однократно, подкожно/внутримышечно. Перед применением флакон с лекарственным препаратом тщательно встряхнуть.

Дозы: крупному рогатому скоту – подкожно у основания уха в дозе 2 мл препарата на 30 кг живого веса (эквивалентно 6,6 мг цефтриофура / кг массы тела животного); свиньям – внутримышечно в область шеи в дозе 1 мл препарата на 20 кг массы тела животного (эквивалентно 5,0 мг цефтриофура / кг массы тела животного). Максимальный объем препарата для введения в одно место инъекции не должен превышать 5 мл для свиней и 20 мл для крупного рогатого скота.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность животного к бета-лактамам антибиотикам и/или другим компонентам препарата

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо: КРС – 20 дней, свиньи – 71 день. Молоко можно использовать для пищевых целей без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 2 года с даты производства, после вскрытия флакона – не более 28 суток при соблюдении условий хранения.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы по 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Комплексный антибактериальный препарат широкого спектра действия

ЦЕФТИОФЕН

«Цефтиофен» – комплексный антибактериальный лекарственный препарат. В 1 мл в качестве действующего вещества содержит цефтиофуру (как гидрохлорид) – 50 мг, кетопрофен – 100 мг, вспомогательные вещества – до 1 мл. Представляет собой стерильную суспензию для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: комплексный антибактериальный препарат.

Цефтиофуру является цефалоспориновым антибиотиком третьего поколения, он активен в отношении различных грамположительных и грамотрицательных бактерий. Кетопрофен проявляет действия, аналогичные таковым у других нестероидных противовоспалительных средств, он обладает противовоспалительным, обезболивающим действием.

Антибиотик широкого спектра, в сочетании с нестероидным противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим препаратом, убивает грамположительные и грамотрицательные бактерии и бактериальные штаммы, продуцирующие бета-лактамазы. Цефтиофуру активен против *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Histophilus Somni (Haemophilus Somnus)*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Moraxella bovis*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Haemophilus spp.*, *Escherichia coli spp.*, *Salmonella spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

КРС, овцы, козы: респираторные заболевания КРС (BRD), лихорадка при перевозке или коровья пневмония, острый межпальцевый некробактериоз (копытная гниль). Лечение и профилактика инфекций репродуктивных органов (метрит).

Свиньи: бактериальные респираторные заболевания. Лечение и профилактика инфекций репродуктивных органов (метрит). Сочетание препаратов в этом продукте является эффективным в лечении инфекционных или потенциально инфекционных процессов, связанных с болями и воспалением. Такие процессы включают: острый и хронический ламинит, острые инфекционные маститы, дистоции. Это также продукт, который используется в послеоперационный период (кесарево сечение и другие операции, такие как удаление рогов у взрослых телят).

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутримышечно. Перед применением тщательно встряхнуть. КРС: препарат применяют в дозе 1–2 мл на 50 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней. Предпочтительное место для введения – задняя конечность.

Свиньи: препарат применяют в дозе 1–2 мл на 16 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней. Предпочтительное место для введения – шея, для маленьких поросят – задняя конечность.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность к цефтиофуру или бета-лактамам антибиотикам.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо: КРС, МРС – 4 дня; свиньи – 5 дней.

Молоко: без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 2 года с даты производства. После вскрытия флакона препарат следует хранить в холодильнике в течение 28 дней. Хранить продукт при температуре 0°C до +25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы по 100 мл.



Мощное противовоспалительное, противоаллергенное и антистрессовое средство

ДЕКСА ВМД

«Декса ВМД» – гормональное лекарственное средство, содержащее в 1 мл препарата в качестве действующего вещества 2,64 мг дексаметазона натрия фосфата, а также вспомогательные компоненты – до 1 мл. Представляет собой стерильную водную суспензию для инъекций белого цвета.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дексаметазон, входящий в состав препарата, является синтетическим глюкокортикостероидом, который обладает сильным противовоспалительным, противоаллергическим, десенсибилизирующим эффектом и иммунодепрессивной активностью.

Дексаметазон действует на все этапы воспалительного процесса: ингибирует синтез простагландинов на уровне арахидоновой кислоты, синтез «провоспалительных цитокинов», также повышает устойчивость клеточной мембраны к действию различных повреждающих факторов. После внутримышечного введения препарата дексаметазон натрия фосфат начинает быстро всасываться из места введения. Максимальная концентрация препарата в плазме крови обнаруживается через 60 минут. Терапевтическая концентрация в сыворотке крови сохраняется до 96 часов в зависимости от вида животного. Биодоступность при внутримышечном введении составляет 100 %. Биотрансформация дексаметазона происходит в печени и частично в фибробластах, участвующих в процессе метаболизма. Метаболиты в основном выводятся с фекалиями и мочой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Назначают крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям, овцам, козам, собакам и кошкам для лечения воспалительных

процессов и заболеваний (посттравматические отеки, заболевания суставов, острые маститы и кетоз, аллергические дерматиты, экзема).

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

«Декса ВМД» применяют животным однократно внутримышечно в следующих дозах: КРС: 1 мл на 40 кг веса тела; свиньи, МРС: 1 мл на 20 кг веса тела; собакам: 0,5 – 1 мл.; кошкам: 0,25 – 0,5 мл. При необходимости препарат применяют повторно через 7 дней.

При лечении воспалений осложненных патогенной и условно патогенной бактериальной микрофлорой «Декса ВМД» назначают только в сочетании с антибактериальными лекарственными средствами широкого спектра действия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Запрещается применять препарат беременным животным. Не назначать препарат одновременно с вакцинами из-за иммуносупрессивного действия кортикостероидов.

Не применять у животных с вирусными и грибковыми заболеваниями, диабетом, остеопорозом, гиперадренкортицизмом, болезнями почек и сердечной недостаточностью.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо: 0 дней. Молоко: 2 дня.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. Хранят в сухом, в защищенном от света месте при температуре от 5 до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклообразные флаконы объемом 100 мл.



Мощный нестероидный противовоспалительный препарат

КЕТОВЕТ 100

Инъекционный раствор кетопрофена, содержащий в качестве действующего вещества на 1 мл препарата кетопрофен – 100 мг, а также вспомогательные компоненты: L-Аргинин – 72 мг, бензиловый спирт – 0,01 мл, дистиллированную воду – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: нестероидное противовоспалительное средство, оказывающее противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действие. Кетопрофен, входящий в состав “Кетовета 100”, является производным пропионовой кислоты из группы карбоновых кислот, в терапевтических дозах ингибирует преимущественно цикло-оксигеназу-II, обеспечивая противовоспалительный и жаропонижающий эффект, и не влияет на циклооксигеназу-I, сводя к минимуму развитие побочных эффектов, таких, как кровотечения, образование язв и нарушение функции почек. Обезболивающее действие кетопрофена связано с ингибированием непосредственно брадикинина, возбуждающего болевые нервные окончания и тем самым провоцирующего боль. Кетопрофен оказывает воздействие на центральную нервную систему, подавляя восприятие боли. В рекомендуемых дозах “Кетовет 100” не оказывает местнораздражающего, мутагенного, канцерогенного, эмбриотоксического и тератогенного действия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

“Кетовет 100” назначают свиньям, крупному рогатому скоту, лошадям, овцам и козам для лечения воспалительных процессов

при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, болевого синдрома различной этиологии (травматическая и послеоперационная боль, колики, грыжи межпозвоночных дисков), а также в качестве жаропонижающего средства при болезнях, сопровождающихся повышением температуры.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Свиньям, крупному рогатому скоту, овцам и козам: 1 мл на 30–50 кг веса тела в день, внутримышечно 1 раз в день – 3 дня; лошадям: 1 мл на 50 кг веса тела в день, внутримышечно или внутривенно 1 раз в день в течение 3 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрагический синдром, а также выраженная почечная и печеночная недостаточность. Не применять “Кетовет 100” на беременных лошадях и лошадях с аллергией к аспирину.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо: 5 суток. Молоко: без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 2 года. После вскрытия флакона – 30 дней. Хранить от попадания прямых солнечных лучей (t от 5 °С до 25 °С).

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Лечение и профилактика респираторных заболеваний

ЛОКСИК 2%

«Локсик 2%» – лекарственный препарат, предназначенный для лечения воспалительных процессов различной этиологии у животных. В 1 мл «Локсик» в качестве действующего вещества содержит 20 мг мелоксикама, а в качестве вспомогательных веществ – 150 мг этанола, воду для инъекций до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа: нестероидные противовоспалительные лекарственные средства. Мелоксикам, входящий в состав лекарственного препарата, обладает выраженной противовоспалительной и анальгетической активностью. Механизм действия мелоксикама заключается в блокировании рецепторов, ответственных за выработку простагландина E, участвующего в воспалительном процессе.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Локсик 2%» используют в качестве противовоспалительного и анальгетического лекарственного средства крупному рогатому скоту при диарее в сочетании с регидрационной терапией, при острых респираторных инфекциях, гнойно-катаральном мастите в комплексе с соответствующей антибактериальной терапией, а также при воспалительных процессах опорно-двигательного аппарата. Свиньям при нарушении функций опорно-двигательного аппарата, связанного с воспалительными процессами не инфекционной этиологии, при терапии послеродового сепсиса и синдрома мастит-метрит-агалактия в комплексе с соответствующими антибактериальными препаратами.

Лошадям при хронических и острых болезнях опорно-двигательного аппарата и коликах в качестве противовоспалительного и анальгетического средства.

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

«Локсик 2%» вводят крупному рогатому скоту однократно подкожно или внутривенно в дозе 2,5 мл на 100 кг массы животного;

свиньям однократно внутримышечно в дозе 2,0 мл на 100 кг массы животного, что соответствует 0,4 мг мелоксикама на 1 кг массы животного. По показаниям возможно повторное введение свиньям лекарственного препарата через 24 часа. Лошадям применяют препарат однократно внутривенно в дозе 3,0 мл на 100 кг массы животного, что соответствует 0,6 мг мелоксикама на 1 кг массы животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не разрешается применение препарата телятам, не достигшим недельного возраста, жеребяткам, не достигшим 6 недельного возраста, жеребым или лактирующим кобылам, животным с поражениями печени, сердечно-сосудистой системы, нарушениями функции почек и геморрагических проявлениях, при повышенной чувствительности к действующему веществу. Запрещается одновременное применение лекарственного препарата «Локсик 2%» с глюкокортикостероидами, другими нестероидными противовоспалительными препаратами, а также антикоагулянтами.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 15 суток, свиней и лошадей – через 5 суток после применения препарата. Молоко можно использовать в пищевых целях не ранее, чем через 5 дней после применения препарата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 2 года с момента изготовления, после вскрытия флакона – не более 30 суток.

Хранить в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Для стимулирования неспецифического иммунного у крупного рогатого скота

ФОРТИМУНЕ БОВ

«Фортинмун БОВ» – лекарственный препарат общего действия, иммуномодулятор для КРС. В качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится: липосахарид *Ochrobactrum intermedium* LMG 3306 – 6 мкг, а также вспомогательные вещества – до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: лекарственный препарат общего действия, иммуномодулятор для КРС.

Липосахарид *Ochrobactrum intermedium* LMG 3306 является компонентом внешней мембраны грамотрицательных бактерий и стимулирует врожденную иммунную систему после бактериальной инфекции. Он модулирует иммунный ответ, взаимодействуя главным образом с TLR4 и, в меньшей степени, с TLR2, что приводит к индукции IL-12 и умеренной непатогенной индукции TNF-альфа и неопределяемые уровни IL-10. Следовательно, LPS Липосахарид *Ochrobactrum intermedium* LMG 3306 является частичным агонистом TLR, который непосредственно взаимодействует с теми же рецепторами, что и патогенные липосахариды от инвазивных организмов. Однако Липосахарид *Ochrobactrum intermedium* LMG 3306 в 100–1000 раз менее биологически активен, чем патогенный липосахарид, и, следовательно, не вызывает и не усиливает иммунный ответ в той же степени. Тем не менее, частичного агонизма липосахарида в отношении TLR2 / 4 достаточно для стимулирования развития врожденного иммунного ответа Th1, что, в свою очередь, приводит к

иммуномодулирующим эффектам вследствие активации макрофагов, а также индукции и секреции провоспалительных цитокинов, таких как TNF-альфа.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Фортинмун БОВ назначают КРС для стимулирования неспецифического иммунного ответа для уменьшения симптомов мастита, вызванных *Staphylococcus aureus* и уменьшения количества соматических клеток. После введения Фортинмун БОВ стимулирующий эффект наступает через 4 часа.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутримышечно. Однократно. Перед применением тщательно встряхнуть.

КРС препарат применяют в дозе 5 мл на голову. Повторное введение препарата через 15 дней после первой инъекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выявлено.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 3 года с даты производства, после вскрытия флакона – 10 часов. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от +2°C до +8°C. Хранить в недоступном для детей месте.

ФОРМА ВЫПУСКА

«Фортинмун БОВ» выпускают в стеклянных флаконах объемом 50 и 100 мл.



Нестероидный противовоспалительный препарат нового поколения

ФОРТИС

Фортис – лекарственный препарат, предназначенный для повышения эффективности антибиотикотерапии, сокращения сроков выздоровления и сохранения продуктивных качеств у свиней и КРС за счет снятия воспаления и болевого синдрома. В 1 мл Фортис в качестве действующих веществ содержится флуниксин меглумин – 83.0 мг (эквивалентно 50 мг Флуниксина), а также вспомогательные вещества до 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармокотерапевтическая группа лекарственного препарата: нестероидное противовоспалительное лекарственное средство. Флуниксин, входящий в состав препарата, является неселективным ингибитором циклооксигеназ (ЦОГ1 и ЦОГ2), угнетает синтез простагландинов E2 – медиаторов воспаления, что обуславливает его анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее и антитоксическое действие. После парентерального введения флуниксин быстро всасывается из места инъекции и проникает в большинство органов и тканей, достигая максимальной концентрации в крови через 5–45 минут. Препарат аккумулируется в очаге воспаления, обеспечивая терапевтический эффект продолжительностью до 24 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат назначают в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства при акушерско-гинекологических, желудочно-кишечных, респираторных заболеваниях, как индивидуально, так и комплексно с антибактериальными средствами; при заболеваниях опорно-двигательного аппарата для купирования воспалительных процессов; для снятия болевого синдрома различной этиологии у свиней, лошадей, крупного рогатого скота.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Лошадям Фортис применяют внутривенно: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата – в дозе 1 мл на 45 кг массы животного один раз в сутки до улучшения клинического состояния животного, но не более 5 дней подряд.

КРС применяют один раз в сутки внутривенно или внутримышечно при респираторных заболеваниях, острых маститах, других заболеваниях, сопровождающихся острым воспалением, в дозе 2 мл на 45 кг массы животного в зависимости от тяжести воспалительного процесса, до улучшения клинического состояния животного, но не более 5 дней подряд.

Свиньям Фортис применяют однократно глубоко внутримышечно в область шеи при ММА-синдроме и респираторных заболеваниях в дозе 2 мл на 45 кг массы животного.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Длительное лечение нестероидно-противовоспалительными препаратами может привести к образованию желудочно-кишечных язв. У лошадей, в редких случаях наблюдаются анафилактические реакции сразу после внутривенного введения и потеря аппетита.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Молоко – 24 часа после последнего применения. Мясо КРС, Лошадей – 4 суток, у свиней – 18 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 3 года. После вскрытия флакона – не более 28 суток. Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте при температуре от 5 до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают в стеклянных флаконах объемом 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Быстрое действие против кокцидий

ТОЛТРА ВИМ

“Толтра Вим” для профилактики и лечения кокцидиоза у сельскохозяйственной птицы, поросят, телят, козлят и ягнят. Лекарственная форма: суспензия для орального применения. “Толтра Вим” в качестве действующего вещества на 1 л препарата содержит: толтразурил – 50 г, вспомогательные компоненты: глицерин – 100 мл, миндальное масло – 150 мл, пропиленгликоль – 100 мл, дистиллированную воду – до 1 л.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: противококцидное средство. Толтразурил, входящий в состав, обладает широким спектром антикокцидийного действия на стадиях внутриклеточного развития разнообразных паразитов, таких как *Isospora* и *Eimeria* spp. Его часто применяют при кокцидиозе *Isospora suis* у новорожденных поросят. Также эффективен в отношении всех видов паразитирующих кокцидий у птиц, включая *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mitis*, *E. praecox*, *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. ankeris*, *E. truncata*, в том числе устойчивых к другим антикокцидийным препаратам. После перорального введения лекарственного средства толтразурил медленно всасывается и оказывает кокцидицидное действие на слизистой и подслизистой оболочках желудочно-кишечного тракта. Выводится толтразурил из организма животных в основном в неизменном виде.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

“Толтра Вим” назначают при кокцидиозе с лечебно-профилактической целью сельскохозяйственной птице, поросятам, телятам, козлятам и ягнятам.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для сельскохозяйственной птицы: 1 мл/2 литра питьевой воды в течение двух последовательных дней; поросятам: 0,5 мл на поросенка возрастом от 3 до 5 дней, только пероральное применение; поросятам старше одной недели: 1 мл на 2,5 кг массы тела, пероральное применение; телятам: 4 мл на 10 кг массы тела в клинических случаях; козлятам/ягнятам: 4 мл на 10 кг массы тела, принимается на 7–10 день после выведения животных на пастбище. Примечание: лечебная вода должна быть единственным источником питьевой воды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать препарат одновременно с другими антикокцидиальными средствами. Запрещается применение “Толтра Вим” курам–несушкам ввиду накопления препарата в яйцах.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо – 4 дня после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 2 года с момента изготовления. После вскрытия флакона не более 28 дней. Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте при температуре от 3°C до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают в пластиковых бутылках вместимостью 120 мл, 250 мл, 500 мл и 1 литр.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Лечение и профилактика заболеваний, вызываемых эндо- и эктопаразитами

ДОРАСУЛЕС 1%

«Дорасулес 1%» – раствор для инъекций против эндо и эктопаразитов у КРС, овец и свиней. Препарат в 1 мл содержит: дорамектин – 10 мг, вспомогательные вещества.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дорамектин, входящий в состав препарата, связываясь с рецепторами клеток мышечной и нервной ткани паразитов, увеличивает проницаемость мембран для ионов хлора, что приводит к блокаде электрической активности нервных и мышечных клеток нематод и членистоногих, их параличу и гибели. Фармакокинетические свойства дорамектина обеспечивают длительное сохранение терапевтических концентраций препарата в крови животных и защиту их от паразитарных заболеваний и реинвазии в течение длительного времени (до 28 дней).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Дорасулес 1%» назначают КРС, овцам и свиньям для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых нематодами желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки, слезных протоков, личинками подкожных и носоглоточных оводов, личинками мух, блохами, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Крупному рогатому скоту и овцам применяют подкожно или внутримышечно (в область шеи) однократно в дозе 1 мл на 50 кг живого веса (эквив. 200 мг дорамектина на кг живого веса). При необходимости повторить.

Свиньям применяют только внутримышечно однократно в дозе

1 мл на 33 кг живого веса (эквивалентно 300 мг дорамектина на кг живого веса).

Для лечения клеща *Psoroptes ovis* у овец применять в дозе 1 мл на 30 кг живого веса (эквивалентно 333 мг дорамектина на кг живого веса) двукратно с перерывом в 1 неделю.

Для устранения клеща *Boophilus microplus* на ферме, необходимо применять «Дорасулес 1%» каждые 21 день.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Убой крупного рогатого скота и овец на мясо после применения «Дорасулес 1%» разрешается не ранее, чем через 49 суток после последнего применения.

Убой свиней на мясо после применения «Дорасулес 1%» разрешается не ранее, чем через 28 суток после введения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять на животных, чье молоко предназначено для производства и потребления человеком.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке 2 года со дня производства. Хранят лекарственный препарат в сухом помещении при температуре от 5 до 25°C, защищенном от прямых солнечных лучей, в закрытой упаковке. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.


ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают препарат расфасованным по 10, 50, 100, 250, 500 и 1000 мл в стеклянных флаконах соответствующей вместимости, упакованных по штучно в картонные коробки.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Гормональный препарат для профилактики и лечения послеродовых осложнений

БИОЛАКТИН

«Биолактин» – гормональный препарат в 20 г вещества содержит: пролактин животный – 1000 МЕ, а также вспомогательные компоненты: маннитол – 6,0 мг, натрий фосфорнокислый двузамещенный – 14,4 мг, консервант – 3 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат «Биолактин» содержит пролактин – гормон, который секретируется передней долей гипофиза. Пролактин регулирует в организме синтез составных частей молока, а так же стимулирует молочную железу и лактацию. Гормон принимает так же участие в регулировании биосинтеза белков и жиров. Является так же фактором, усиливающим сопротивляемость организма и уменьшающим стресс.

Применение «Биолактоина» свиноматкам с признаками первичной агалактии, также как в случае агалактии, вызванной эндотоксинами *Escherichia coli*, стимулирует образование молока (лактацию) в течение 1–2 часов после инъекции. Пролактин, примененный у первородящих свиноматок 24 часа после родов, существенно увеличивает лактацию.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется при первичной агалактии у свиноматок, агалактии, сопутствующей воспалительным процессом молочной железы и матки (ММА), одновременно с принятым способом лечения, как профилактика агалактии у первородящих свиноматок, как профилактика агалактии у свиноматок, у которых имело место нарушение молокоотделения в предыдущий лактационный период.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутримышечно. Однократно. Содержимое флакона растворить в 50 мл растворителя.

Препарат применяют в дозе 5,0 мл раствора на 1 животное (эквивалентно 100 МЕ на животное) сразу после первых признаков агалактии у свиноматок. При необходимости инъекцию повторяют через 24 часа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний не выявлено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждение и особые меры осторожности, касающиеся применения в рекомендуемых дозах неизвестны и не требуются. Побочное действие не выявлено, в случае применения рекомендуемых доз.

В период беременности и лактации нет противопоказаний к применению препарата в рекомендуемых дозах. При пониженной лактации и агалактии синдром ММА препарат является необходимым средством. При применении препарата согласно инструкции, не известны случаи передозировки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 2 года с даты производства. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре 2–8°C. Хранить в недоступном для детей месте.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают в стеклянных флаконах по 50 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Лечение и регуляция воспроизводительной функции у самок сельскохозяйственных животных

ДИНОПЛУС

«Диноплюс» – гормональный препарат, содержащий в 1 мл в качестве действующего вещества клопростенол 250 мкг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«Диноплюс» оказывает лютеолитическое действие на желтые и персистентные желтые тела яичников, нормализует функциональное состояние яичников, вызывая течку и овуляцию фолликулов. Кроме того, клопростенол оказывает сокращающее действие на гладкую мускулатуру матки, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и на сосудистую систему. Время введения препарата до появления первых признаков половой охоты составляет 48–60 часов. Наиболее подходящим сроком для искусственного осеменения является 76–ой час с момента введения препарата (у кобыл на 24 часа позже).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Назначают для регуляции воспроизводительных функций у коров и свиноматок, родовспоможения, лечения функциональных нарушений яичников, а также при эндометрите (в комплексе с антибактериальными лекарственными средствами). «Диноплюс» используется для прерывания беременности при патологии плода (до 120 дня беременности).

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Коровам вводят внутримышечно или подкожно в дозе 2 мл на голову. Для синхронизации половой охоты у коров «Диноплюс»

используют в той же дозе два раза с интервалом 11 дней. Свиноматкам вводят внутримышечно в дозе 0,7 мл на голову для стимуляции родов, а также с целью профилактики эндометритов и синдрома ММА.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не допускается применение до 113–го дня беременности. Совместное введение с окситоцинами усиливает эффективность последних.

Не рекомендуется вводить совместно с другими лекарственными средствами, кроме окситоцина.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Мясо крупного рогатого скота и свиней разрешается к употреблению через 1 день после окончания лечения. Молоко от коров, которым вводили «Диноплюс», можно использовать для пищевых целей без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 2 года с момента изготовления.

Хранить в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 8°C до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 10 и 20 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Лечение мастита у коров в период лактации

УЛЬТРАМИК

«Ультрамик» – антибактериальный препарат предназначенный для лечения клинического и субклинического маститов у коров в период лактации. В 10 мл препарата (1 шприц-дозатор) содержится: спирамицина адипинат – 300 мг, неомицина сульфат – 370 мг (соответствует 250 мг неомицина), флуметазон – 2,5 мг, витамин Д3 – 0,1 мг. Вспомогательные вещества – до 10 мл.

«Ультрамик» представляет собой суспензию от светло-желтого до желтого цвета. Упаковка – пластиковый шприц-дозатор объемом 10 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: антибактериальный препарат. Ультрамик – это противомаститный препарат широкого спектра действия. Комбинация спирамицина, неомицина, флуметазона и витамина Д3 представляют собой синергичную формулу для лечения клинического и субклинического маститов у крупного рогатого скота в период лактации. Имеет высокую эффективность против распространенных патогенов, таких как: *Staphylococcus aureus*, *Coagulase negative staphylococcus*, *Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Coliforms*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae* и *Micrococcus spp.*

Спирамицин – антибиотик класса макролидов, которые ингибируют синтез белка, является бактериостатическим препаратом. Неомицин – аминогликозидный антибиотик, обладающий бактерицидным действием, действуя более чем на 30 S субъединиц рибосомы и останавливая бактериальный синтез

белка. Флуметазон – глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным, противоаллергическим действием. Резорбтивного действия не оказывает, поскольку через неповрежденную кожу и слизистые практически не всасывается.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Ультрамик» предназначен для лечения клинического и субклинического маститов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к спирамицину, неомицину или их комбинациям, у коров в период лактации.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Интрацистернально. Многократно. Препарат назначают в дозе 1 шприц-дозатор в каждую пораженную долю вымени 1 раз в сутки в течение двух дней. Перед применением препарата пораженную четверть вымени полностью освобождают от молока, дезинфицируют сосок. С наконечника шприца снимают колпачок и вводят наконечник в молочный канал вымени. Содержимое шприца полностью выдавливают в пораженную четверть, после чего удаляют шприц, пережимают верхушку соска и массируют четверть.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Мясо – 8 дней, молоко – 96 часов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять стельным животным.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 3 года с даты производства.


ФОРМА ВЫПУСКА

Шприцы-дозаторы объемом 10 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Спрей для местной обработки экзем, язв, порезов, царапин, ссадин у домашних и с/х животных и птиц

АЛЮСОЛ

«Алюсол» – препарат для защиты порезов, царапин, ссадин у домашних и сельскохозяйственных животных и птиц от инфицирования, попадания раздражающих веществ и воды. В 1 г содержится: алюминий (в виде порошка) – 40 мг, жидкий парафин – 120 мг и вспомогательные вещества. «Алюсол» представляет собой суспензию серебристо-серого цвета.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Алюсол относится к местным защитным средствам.

Фармакотерапевтическая группа лекарственного средства: дерматологические, антисептические и дезинфицирующие средства, алюминиевые агенты. Микронизированный алюминий используется для заживления ран. Обладает противомикробным действием за счет устранения микроорганизмов из покрытых им тканей. Алюсол при распылении образует мелкодисперсный туман, полностью покрывающий раны. Полученная таким образом пленка обеспечивает хорошую защиту от загрязнений и насекомых, ускоряет заживление ран и обладает противомикробным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат назначается с целью защиты порезов, царапин, ссадин у домашних и сельскохозяйственных животных и птиц от инфицирования, попадания раздражающих веществ и воды. Препарат применяется для местной обработки экзем, язв и небольшого воспалительного высыпания на коже. Также препарат является вспомогательным средством для защиты операционных ран.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Хорошо встряхнуть перед использованием.

Перед применением препарата необходимо удалить с обрабатываемой поверхности загрязнения, некротизированные ткани, гной и раневой экссудат. Перед использованием баллон с препаратом следует хорошо встряхнуть и распылять на расстоянии 10 – 20 см от пораженного участка в течение 1 – 2 секунд. Препарату дают впитаться в течение 3 минут, не позволяя животному слизывать образовавшуюся пленку. «Алюсол» применяют 1 – 2 раза в сутки. Курс лечения зависит от тяжести раны и скорости ее заживления, но не должен превышать 10 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Ограничений по срокам убоя сельскохозяйственных животных на мясо и использованию молока в пищевых целях нет. В случаях вынужденного убоя необходимо удалить и утилизировать участок тела, подвергавшийся лечению препаратом.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года с даты производства. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до +30°C.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Алюминиевые баллоны по 150 г с аэрозольным клапаном, закрытые колпачком.



Антибактериальный препарат в форме аэрозоля для наружного применения

АПОДЕРМ

«Аподерм» – антибактериальный препарат в форме спрея для наружного применения. В качестве действующего вещества содержит: хлортетрациклина гидрохлорид – 21,5 мг (эквивалентно 20 мг хлортетрациклина), и вспомогательные вещества.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальные лекарственные препараты группы тетрациклинов.

Входящий в состав препарата хлортетрациклина гидрохлорид обладает выраженными антибактериальными свойствами в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вызывающих инфекции кожи и копыт у животных, включая сальмонелл, стафилококков, стрептококков, а также риккетсий, хламидий, некоторых видов микоплазм. Механизм антибактериального действия хлортетрациклина основан на нарушении доступа tRNA– к mRNA–рибосомному комплексу, прекращении синтеза белка и гибели микробной клетки.

«Аподерм» по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007–76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах не обладает тератогенным и фетотоксическим действиями.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Аподерм» применяют КРС, МРС, свиньям, лошадям, сельскохозяйственной птице, собакам и кошкам для обработки случайных или вызванных хирургическим вмешательством поверхностных ран на коже, загрязненных микроорганизмами, чувствительными к хлортетрациклину, а также в качестве вспомогательного средства при обработке копыт, когтей и кожи

в случае кожных инфекций, в особенности таких, как межпальцевой дерматит, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к хлортетрациклину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением препарата с пораженной поверхности удалить загрязнения, шерсть, некротизированные ткани, гной и раневую экссудат. Баллон тщательно встряхнуть и, нажимая на распылительную головку, распылить препарат на пораженный участок с расстояния 15–20 см в течение 2–3 секунд до достижения равномерного распределения препарата. Обработки проводят 1–2 раза в сутки до полного заживления пораженной поверхности, но не более 10–14 суток. При лечении поражений в области головы следует предотвращать попадание препарата в глаза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к одному из компонентов препарата

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Без ограничений. В случае вынужденного убоя животного, обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года со дня производства. Хранят лекарственный препарат при температуре от +15 °С до +30 °С.

ФОРМА ВЫПУСКА

Баллон 250 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com

Антибактериальный препарат в форме спрея для лечения воспалительных заболеваний КОЖИ И КОПЫТ

СУПЕРС СПРЕЙ

«Суперс Спрей» – антибактериальный препарат в форме спрея для лечения воспалительных заболеваний кожи и копыт бактериальной этиологии у КРС, лошадей, свиней, овец, коз, собак, и птицы. В качестве действующего вещества в 1 баллоне (200 мл) содержится хлортетрациклин – 3,56 г, а так же вспомогательные вещества.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«Суперс Спрей» относится к группе антибактериальных препаратов группы тетрациклинов. Хлортетрациклина гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, подавляет рост и развитие большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Streptococcus spp.*, *Hamophilus spp.*, *Clostridium spp.*, *Fusobacterium spp.*, а также *Rickettsia*, *Chlamidia spp.*, *Protozoa spp.*

Механизм антибактериального действия хлортетрациклина основан на подавлении белкового синтеза микробной клетки (блокада функции рибосом) и блокаде синтеза РНК.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Суперс Спрей» назначают крупному рогатому скоту, лошадям, свиньям, овцам, козам, собакам, птице для лечения воспалительных заболеваний, заболеваний кожи и копыт бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к тетрациклинами микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и

нагревательных приборов. Перед применением препарата с пораженной поверхности удаляют загрязнения, шерсть, некротизированные ткани, гной и раневой экссудат.

Баллон тщательно встряхнуть и, нажимая на распылительную головку, распылить препарат на пораженный участок с расстояния 18–20 см в течение 2–3 секунд до достижения равномерного распределения красителя.

Обработки проводят 1 раз в 5–7 дней, до полного заживления пораженной поверхности, но не более чем 4 раза. При лечении поражений в области головы следует предотвращать попадание препарата в глаза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лекарственный препарат запрещается применять животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к антибиотикам тетрациклиновой группы.

Следует избегать попадания препарата в глаза животных.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Продукция животного происхождения при вынужденном убое во время и после применения «Суперс Спрея» используют без ограничений, за исключением обработанных препаратом участков, которые необходимо удалить с туши и утилизировать.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 3 года с момента изготовления. Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 8°C до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Баллон 200 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Профилактика и лечение дефицита витамина В1 у с/х животных

АЛИПАМИН 100

Инъекционный раствор в качестве действующего вещества в 1 мл препарата содержится: тиамин тетрагидрофурурил дисульфид (фурсультиамин) – 5 мг, а так же вспомогательные вещества: глюкоза – 0,4 г. Вода для инъекций – д.о. 1 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: витаминный препарат.

В организме большинства животных витамин В1 не образуется и должен поступать в готовом виде с пищей. Витамин В1 (тиамин) регулирует углеводный обмен, улучшает работу ЦНС, необходим для нормальной работы нервов, мышц и сердца.

Витамин В1 необходим для окислительного декарбоксилирования кетокислот, (пировиноградной и молочной), синтеза ацетилхолина, он участвует в углеводном обмене и связанных с ним энергетическом, жировом, белковом, водно-солевом обмене, оказывает регулирующее воздействие на трофику и деятельность нервной системы. Тиамин улучшает циркуляцию крови и участвует в кроветворении. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, рост, нормальный аппетит, способность к обучению и необходим для тонуса мышц пищеварительного тракта, желудка и сердца.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Алипамин-100 назначают свиньям, КРС, МРС, лошадям, собакам и кошкам для: профилактики и лечения дефицита витамина В1; профилактики и лечения вастинг синдрома с сопутствующим дефицитом витамина В1, в т.ч. большие физические нагрузки до и после родов, длительные перевозки морским транспортом, тепловой или солнечный удар; лечения нарушений нервной системы с сопутствующим дефицитом

витамина В1, в т.ч. паралич поясничного отдела, нарушение координации движений; лечения синдрома павших коров, а также кетоза, невралгии, мышечной боли, артралгии и нарушений функций сердца, вызванных дефицитом витамина В1.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутримышечно, подкожно, внутривенно. Перед применением тщательно встряхнуть. При внутривенном применении, препарат вводить медленно.

КРС, лошади: препарат применяют животным внутривенно однократно в дозе 10–100 мл на животное в день. Свиньи, МРС: препарат применяют животным внутримышечно/внутривенно/подкожно однократно в дозе 2–50 мл на животное в день. Собаки, кошки: препарат применяют животным внутримышечно/внутривенно/подкожно однократно в дозе 2–20 мл на животное в день. Доза и количество инъекций зависят от веса животного и тяжести состояния.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Без ограничений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При внутримышечном или подкожном введении возможен зуд в месте инъекции.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 2 года. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флакон объемом 100 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Для профилактики и лечения стрессов у с/х животных, и птицы

ВИМЕ-ЛАЙТ IV

«Виме-лайт IV» – изотонический раствор комплексного соединения витаминов, аминокислот и электролитов, обладающий мощным тонизирующим и биостимулирующим действием.

В качестве действующих веществ 1 мл препарата содержит: Витамины: витамин В1 – 0,167 мг, витамин В2 – 0,084 мг, витамин В6 – 0,20 мг, витамин В12 – 0,05 мг, никотинамид – 2,25 мг, декспантенол (d-Пантенол) – 0,1 мг. Электролиты: кальция хлорид – 0,23 мг, магния сульфат – 0,29 мг, калия хлорид – 0,20 мг. Аминокислоты и питательные вещества: декстроза – 45,46 мг, L-аргинин – 0,025 мг, L-цистеин – 0,01 мг, глутамат натрия – 0,04 мг, L-гистидин – 0,01 мг, L-изолейцин – 0,01 мг, L-лейцин – 0,04 мг, L-лизин – 0,03 мг, L-метионин – 0,01 мг, DL-фенилаланин – 0,03 мг, L-треонин – 0,02 мг, DL-триптофан – 0,01 мг, DL-валин – 0,05 мг. Вспомогательные вещества: метилпарабен – 1,80 мг, пропил-парабен – 0,20 мг, динатрия эдетат – 0,15 мг, фенол – 0,10 мг, лимонная кислота, вода для инъекций до 1,0 мл.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат «Виме-лайт IV», является комбинацией питательных веществ, электролитов, витаминов и аминокислот, которые нормализуют обмен веществ и оптимизирует физиологические функции организма животных в том числе птицы, а также кошек и собак. Декстроза – участвует в различных процессах обмена веществ в организме, усиливает окислительно-восстановительные процессы в организме, улучшает антиоксидантную функцию печени. Вливание растворов декстрозы частично восполняет водный дефицит. Электролиты быстро восстанавливают водно-солевой баланс в организме животных и птицы, контролируя осмотический баланс клетки и выводя из клетки токсины и шлаки. Витамины, содержащиеся в препарате, профилактуют последствия стрессов, повышают защитные

функции организма животных и птицы. Входящие в состав «Виме-лайт IV» аминокислоты необходимы для ускорения синтеза белка в крови и тканях организма. Высоко усвояемая форма аминокислот отличает данный препарат от химически синтезированных аминокислот. Благодаря высокой степени усвояемости препарата значительно увеличивается продуктивность животных и птицы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат назначают для лечения и как поддерживающая терапия при гиповитаминозе, нарушения обмена веществ, для повышения продуктивности и резистентности организма, для профилактики и лечения стрессов у с/х животных, в том числе птицы, а также кошек и собак.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят, используя следующие способы введения и дозы: свиньи, КРС: медленно внутривенно, подкожно, внутривенно до 100 мл на 50 кг массы животного; поросята, телята, жеребята: до 30 мл на 5 кг массы животного; лошади: медленно внутривенно до 100 мл на 50 кг массы животного; цыплята (возраст 1 день): подкожно 0,5–1 мл на цыпленка; собаки, кошки: медленно внутривенно, подкожно до 50 мл на 5 кг массы животного. Можно использовать при беременности и в период лактации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При применении препарата в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений не отмечено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25°C. Срок годности – 2 года.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пластиковые флаконы объемом 500 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Препарат на основе эфирных масел для обработки птицеводческих и животноводческих помещений методом «сухого аэрозоля»

ФУМИТЕ АРОМА

Препарат на основе эфирных масел для обработки птицеводческих и животноводческих помещений методом «сухого аэрозоля».

СОСТАВ

В состав Фумите Арома входят эфирные масла каепутового дерева (*Melaleuca leucadendron*), литсея кубеба (*Litsea cubeba* ou citrate) и чайного дерева (*Melaleuca alternifolia*).

СВОЙСТВА

Фумите Арома обладает антистрессовыми, успокоительными и антисептическими свойствами благодаря маслам, входящим в его состав. Масло каепутового дерева применяют для лечения респираторных инфекций. Лечебные свойства масла чайного дерева базируются на его способности уничтожать бактерии.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Как отхаркивающее средство при заболеваниях дыхательных путей; противовирусная профилактика в птицеводческих и животноводческих помещениях; нормализация работы ЖКТ у с/х животных и птицы; улучшение аппетита и потребления корма; снижение уровня стресса; стимуляция развития иммунной системы у с/х животных и птицы.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности: 24 месяца с даты выпуска. Хранить продукт плотно закрытым, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре до 25°C, вдали от источников нагревания и открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Используется в присутствии животных. Разместите банки с препаратом внутри птицеводческого/животноводческого помещения в недосягаемости для животных и вдали от горючих материалов. Остановите работу системы вентиляции, зажгите фитиль и оставьте на 15–60 минут.

По истечении времени использования проверьте температурные показатели помещения и запустите систему вентиляции. В случае возникновения респираторных проблем возможно трехкратное применение препарата с промежутками в 24 часа.

При необходимости повторите обработку.

Если симптомы заболевания не прекращаются, проконсультируйтесь с ветеринаром.

ФОРМА ВЫПУСКА

1 банка 250 г – 800 м³.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Присыпка для сельскохозяйственных животных и птицы

ДРАЙКЛИН

Присыпка «ДрайКлин» в качестве действующих веществ содержит 0,3% активного хлора, соединения цинка, меди, кальция, кремния, минеральную основу и эфирные масла.

Способствует быстрому заживлению раневых поверхностей, обладает антисептическими свойствами и имеет различную область использования.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«ДрайКлин» представляет собой сыпучий порошок от белого до серо-желтоватого цвета со специфическим запахом эфирных масел. Влаго-адсорбционная способность «ДрайКлин» составляет в среднем 1 : 100.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для проведения профилактических дезинфекций и санации производственных помещений в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

- «ДрайКлин» применяется в присутствии животных:
- для заживления раневых поверхностей животных;
- как антисептическое средство;
- для профилактики заболеваний копыт, копытной гнили (прогон через сухие копытные ванны);
- для осушения новорожденных животных;
- для снижения уровня влаги и вредных газов в помещениях;
- активен в отношении личинок мух.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Направление применения	Норма расхода, г
Крупный рогатый скот	80–100 г/м ²
Поросята	100–200
Свиноматки	100–150
Санация помещений фермы	100 г/м ²
Обработка подстилки для птицы напольного содержания	1,5–2% от основного объема подстилки, с увеличением расхода в местах повышенной влажности

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 2 года. Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении при температуре от –25 до +30°C. После вскрытия мешки плотно перевязывать из-за высокой гигроскопичности продукта.

ФОРМА ВЫПУСКА

Бумажные многослойные или полипропиленовые мешки объемом 20–25 кг.



Болюсы для гарантированного обеспечения жвачных животных необходимыми микроэлементами в период сухостоя

ДРАЙ ПЛЮС БОЛЮС

«Драй Плюс» болюс – кормовая добавка для внутреннего применения, предназначенная для гарантированного обеспечения жвачных животных в период сухостоя необходимыми микроэлементами с целью предупреждения гипомикроэлементозов.

В качестве действующих веществ содержит (в 1 кг): ангидридный йодат кальция – 22,8 г, карбонатный моногидратный гидроксид кобальта – 5,7 г, оксид марганца – 314,9 г, оксид цинка – 276,3 г, селенит натрия – 5,9 г; в качестве наполнителя содержит: железо (в форме порошка) – 374,4 г. Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кормовая добавка «Драй Плюс» болюс с повышенным содержанием минералов способствует поддержанию нормального функционирования систем организма жвачных животных. Минеральные вещества необходимы для кроветворения, формирования различных тканей. Они необходимы для построения костяка, непосредственно участвуют в процессах пищеварения, регулируют осмотическое давление и поддерживают в организме кислотно-щелочное равновесие. Обмен белков, углеводов, жиров, водный режим и гормональное функционирование организма невозможны без активного участия минеральных веществ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Драй Плюс» болюс применяют для гарантированного обеспечения жвачных животных в период сухостоя необходимыми

микроэлементами с целью предупреждения гипомикроэлементозов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кормовую добавку «Драй Плюс» болюс применяют жвачным животным в период сухостоя. Перорально. Нормы ввода: период сухостоя – 1 болюс (110 г). Вводить при помощи соответствующего аппликатора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний не установлено.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Продукция от животных после применения «Драй Плюс» болюс может быть использована без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 36 месяцев со дня изготовления. Не использовать препарат после даты окончания срока годности, указанной на упаковке. «Драй Плюс» болюс хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре до 30°C. «Драй Плюс» болюс следует хранить в местах, не доступных для детей.

ФОРМА ВЫПУСКА

«Драй Плюс» болюс выпускают по 110 грамм и упаковывают по 12 единиц в коробку.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Болюсы для гарантированного обеспечения жвачных животных необходимыми микроэлементами

ХАЙ ТРЕЙС БОЛЮС

«Хай Трейс» болюс – кормовая добавка для внутреннего применения, предназначенная для гарантированного обеспечения жвачных животных необходимыми микроэлементами с целью предупреждения гипомикроэлементозов. В 1 кг качестве действующих веществ содержит: ангидридный йодат кальция 42,9 г, карбонатный моногидратный гидроксид кобальта – 9,5 г, оксид меди – 328,6 г, оксид цинка – 293,8 г, селенит натрия – 11,4 г, в качестве наполнителя: порошок железа – 313,8 г. Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кормовая добавка «Хай Трейс» болюс с повышенным содержанием минералов способствует поддержанию нормального функционирования систем организма жвачных животных. Минеральные вещества необходимы для кроветворения, формирования различных тканей.

Они необходимы для построения костяка, непосредственно участвуют в процессах пищеварения, регулируют осмотическое давление и поддерживают в организме кислотно-щелочное равновесие. Обмен белков, углеводов, жиров, водный режим и гормональное функционирование организма невозможны без активного участия минеральных веществ.

«Хай Трейс» болюс предупреждает недостаток минералов в течение всей жизни жвачных животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Хай Трейс» болюс применяют для гарантированного обеспе-

чения жвачных животных необходимыми микроэлементами с целью предупреждения гипомикроэлементозов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кормовую добавку «Хай Трейс» болюс применяют жвачным животным 2 раза в год, весной и осенью. Нормы ввода: весенний период 1 болюс (110 г), осенний период 1 болюс (110 г). Вводить при помощи соответствующего аппликатора 1 раз в 180 дней.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Продукция от животных после применения «Хай Трейс» болюс может быть использована без ограничений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний не установлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 36 месяцев со дня изготовления. «Хай Трейс» болюс хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C. «Хай Трейс» болюс следует хранить в местах, не доступных для детей.

ФОРМА ВЫПУСКА

«Хай Трейс» болюс выпускают по 110 грамм и упаковывают по 12 единиц в коробку.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Болюсы для снижения возникновения послеродового пареза у всех видов жвачных животных

КАЛЬЦИТОП

«Кальцитоп» болюс – кормовая добавка для внутреннего применения, предназначенная для снижения возникновения послеродового пареза у всех видов жвачных животных.

В качестве действующих веществ содержит (в кг): дикальция фосфат – 300 000 мг, сорбитол – 115 500 мг, оксид магния – 15 000 мг, формиат кальция – 569 000 мг, витамин Д3 – 200 000 МЕ. Содержание чистого кальция в одном болюсе (85 грамм) составляет 20 грамм.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

«Кальцитоп» болюс в организме животных активизирует ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической иннервации, увеличивает выделение адреналина, ускоряет выработку многих ферментов. Ионы кальция необходимы для сокращения скелетных мышц и мышц сердца, формирования костной ткани, свертывания крови. Ионы кальция уплотняют стенки кровеносных сосудов, тем самым проявляют противовоспалительное действие и предупреждают развитие отеков. Кальций участвует в процессе свертывания крови, способствует превращению протромбина в тромбин. После попадания «Кальцитоп» болюса в рубец, быстро всасывается и распределяется в органах и тканях животного. «Кальцитоп» болюс предупреждает недостаток кальция в послеродовой период жвачных животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Кальцитоп» болюс применяют для снижения возникновения послеродового пареза у всех видов жвачных животных.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кормовую добавку «Кальцитоп» болюс применяют дойным животным при первых признаках отела до и в течении до двух дней после отела.

Нормы ввода: до отела – 2 болюса за 12–24 часа до отела; после отела – 2 болюса незамедлительно после отела, 1–2 болюса через 12 часов после отела, 1–2 болюса через 24 часа после отела.

Вводить при помощи соответствующего аппликатора.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Продукция от животных после применения «Кальцитоп» болюс может быть использована без ограничений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний не установлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня изготовления. Не использовать препарат после даты окончания срока годности, указанной на упаковке. «Кальцитоп» болюс хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C. «Кальцитоп» болюс следует хранить в местах, не доступных для детей.

ФОРМА ВЫПУСКА

«Кальцитоп» болюс выпускают по 85 г и упаковывают по 12 единиц в коробку.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Кормовая добавка в виде болюса для поддержания физиологического статуса коров

МАСТИТОП БОЛЮС

«Маститоп» – кормовая добавка для поддержания физиологического статуса коров, в виде болюса бежевого цвета. В 100 г в качестве действующего вещества: оксид магния – 72,5 г, а также вспомогательные вещества: стеарат кальция – 2,5 г, рапсовый жир – 10 г, смесь натуральных ароматических компонентов эфирных масел – 15 г (в том числе: чеснока, гвоздики, эвкалипта, пальмарозы).

Аналитический состав: сырой жир – 15,4 %, сырая зола – 77,0 %, влага – 2,4 %, магний (Mg) – 37,2 %, кальций (Ca) – 3,6 %.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации. Добавка кормовая не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Оксид магния участвует в синтезе нуклеиновых кислот, глутатиона и многих ферментов, регулирует обменные процессы, межнейронную передачу и мышечную возбудимость, восстанавливает ионное равновесие, стабилизирует клеточные мембраны. Эфирные масла чеснока, гвоздики, эвкалипта, пальмарозы обладают антимикробным действием, улучшают качество корма и его вкусовые свойства.

Комбинация компонентов кормовой добавки способствует нормализации обмена веществ, поддержанию физиологического статуса коров особенно в период стрессов, повышения количества соматических клеток в молоке, при отелах, в сухостойный период.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Поддержания физиологического статуса коров, при субклинических маститах.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кормовую добавку МАСТИТОП болюс применяют жвачным животным в период лактации и сухостоя. Вводят перорально в рюбель, используя соответствующий аппликатор:

– 1 болюс при повышении количества соматических клеток в молоке;

– 1 болюс за 2 недели до отела;

– 1 болюс при профилактике заболеваний молочной железы.

Активность болюса сохраняется в течение 3 недель. Болюс выделяет ежедневно высокую дозу природных антибиотиков.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Продукция от животных после применения «Маститоп» болюс может быть использована без ограничений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению «Маститоп» болюс не установлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности 24 месяца со дня производства, при температуре от 5°C до 25°C, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте с относительной влажностью не более 80 %.

ФОРМА ВЫПУСКА

«Маститоп» болюс выпускают по 100 гр, упакованных в картонную коробку по 4 штуки.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Кормовая добавка в форме болюсов для компенсации дефицита витаминов и микроэлементов у коров и телок

ФЕРТИТОП БОЛЮС

«Фертитоп» болюс – кормовая добавка, предназначенная для гарантированного обеспечения жвачных животных необходимыми микроэлементами с целью предупреждения гипомикроэлементозов. В качестве действующих веществ в 1 кг «Фертитоп» болюса содержится: йод – 9,5 г, кобальт – 1,8 г, медь – 18,8 г (в форме оксида), медь – 100 г (в форме хелатного соединения глицин гидрата), марганец – 104 г (в форме оксида), марганец – 74,4 г (в форме хелатного соединения глицин гидрата), цинк – 100,9 г (в форме оксида цинка), цинк – 100 г (в форме хелатного соединения глицин гидрата), селен – 1,1 г, витамин А – 5 г, витамин Е – 96 г, бета-каротин – 24 г; наполнители: железо (в форме порошка) – 150 г, стеарат магния – 30 г; жиры растительного происхождения – 144,5 г, ароматическая композиция – 40 г.

Не содержит генно-модифицированных продуктов.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кормовая добавка «Фертитоп» в форме индивидуальных болюсов для компенсации дефицита витаминов и микроэлементов у коров и телок. Применение «Фертитоп» способствует улучшению воспроизводительного потенциала животных, который выражается в сокращении времени отделения последа, инволюции матки и прихода животного в охоту после отела.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Фертитоп» болюс применяют для профилактики метритов, задержания последа при тяжелых отелах, вызванных нехваткой

витаминов и микроэлементов; для компенсации дефицита витамина Е и микроэлементов; для быстрого восстановления репродуктивных функций после отела, вызванного нехваткой витаминов и микроэлементов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перорально. Болюс вводят при помощи специального аппликатора. Молочным коровам в дозе 1 болюс на одну голову (более 260 кг живого веса) за 8–10 дней до искусственного осеменения. Стельным коровам в дозе 1 болюс на одну голову (более 260 кг живого веса) за 8–10 дней до отела.

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ

Продукция от животных после применения «Фертитоп» болюс может быть использована без ограничений.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний к применению «Фертитоп» болюс не установлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности препарата – 2 года с даты производства. Хранить в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.


ФОРМА ВЫПУСКА

«Фертитоп» болюс выпускают по 100 грамм и упаковывают по 12 единиц в коробку.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23–10–545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Полноценный диетический корм предназначенным для стабилизации водно-электролитного баланса у молодых телят и поросят

САКРОЛИТ

«Сакролит» является полноценным диетическим кормом, предназначенным для стабилизации водно-электролитного баланса у молодых телят и поросят.

В качестве действующих веществ содержит: сырой протеин – 0,5%, сырая клетчатка – 0,3%, сырая зола – 12%, неочищенные масла и жиры – 2,4%, натрий – 2,7%, калий – 2,25%, кальций – 0,5%, магний – 0,5%, фосфор – 0,3%, декстроза – 74,6 г, этилцеллюлоза – 8 г, хлорид натрия – 6,5 г, хлорид калия – 2,5 г, цитрат натрия – 4,5 г, монокальцийфосфат – 1,3 г, кальций-D-пантотенат – 150 мг, витамин В1 – 75 мг, витамин В2 – 110 мг, витамин В6 – 40 мг.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основным действующим веществом «Сакролита» является уникальная, запатентованная клетчатка, которая способствует увеличению роста кислотообразующих бактерий, образует защитную пленку на поверхности кишечника, тем самым препятствуя воздействию патогенных бактерий на слизистую оболочку кишечника. Декстроза, входящая в состав препарата, является источником энергии; хлориды калия и натрия предотвращают потерю жидкости из организма животного; витамины группы В являются коферментами многих ферментов, необходимы для нормализации обмена веществ, принимают участие в водном, углеводном, белково-фосфорном обменах. Сакролит обладает приятным вкусом и запахом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется при первых признаках нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят и поросят, которые характеризуются интоксикацией и обезвоживанием

организма с выраженной диареей. Рекомендован для применения ослабленным и отстающим в росте животным и животным, отказывающимся от приема корма.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поросята – 100 г (1 мерная ложка) препарата растворяют в 2,5 л теплой воды (35–40 градусов) и тщательно перемешивают вручную или с помощью автоматических смесителей. Выпойка вволю 2–3 раза в день до исчезновения клинических признаков, рекомендованный курс – 2–3 дня, или до тех пор, пока поросята не начнут потреблять достаточное количество стандартного корма.

Телята – 100 г (1 мерная ложка) препарата растворяют в 2,5 л теплой воды (35–40 градусов) или ЗЦМ и тщательно перемешивают вручную или с помощью автоматических смесителей. Готовым раствором телят выпаивают 2–3 раза в день до исчезновения клинических признаков, рекомендованный курс – 2–3 дня или до тех пор, пока телята не начнут потреблять достаточное количество стандартного корма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ

Без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 3 года с даты изготовления. Готовый раствор использовать в течение 24 часов. Хранить в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пластиковое ведро, 5 кг.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com



Крем-защита для копыт крупного рогатого скота

ДД-ДЕЛЕТ

«ДД-делет» – это крем предназначен для защиты копыт от вредного воздействия навоза и мочи в деннике, для предотвращения межпальцевого кожного воспаления, чрезмерного межпальцевого ороговения и наростов на копытах. Крем уплотняет роговые структуры, снижает риск бактериальной и грибковой инфекции копыт.

В состав крема входит смола, салициловая кислота, сульфат меди, обладающий дезинфицирующим и подсушивающим эффектом, с вяжущим свойством.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Лечебные свойства «ДД-делет» определяются входящими в его состав веществами.

Дегтярная смола обладает рядом свойств: дезинфекция кожного покрова, стимуляция микроциркуляции крови и процесса регенерации кожи, восстанавливает пораженные участки кожи, регенерируя их структуру и восстанавливая функциональность, улучшает питание и кровоснабжение кожных тканей, восстанавливает процесс ороговения эпидермиса.

Салициловая кислота индуцирует выделение ингибиторов фосфолипазы, вместе с тем угнетает биосинтез медиаторов воспаления. Сужает сосуды, улучшая структуру их стенки, а также клеточных мембран. Вызывает мягкое отшелушивание отжившего слоя кожи.

Сульфат меди оказывает прижигающее, антисептическое и эритропоэтическое местное действие.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением «ДД-Делет» необходимо очистить копыто от загрязнений.

Препарат наносится с помощью аппликатора на чистую поверхность копыта. Препарат наносят на поврежденный участок после чего накладывают повязку на 4–5 дней. При необходимости лечение можно повторить.

Препарат должен храниться при комнатной температуре и применяться в теплом состоянии во избежание затвердевания на морозе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Может вызывать аллергическую кожную реакцию. При работе со средством используйте защитные перчатки.

Избегать проглатывания средства и попадания в глаза и на слизистые оболочки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения. Крем следует хранить при температуре от 0°C до 25°C.

ФОРМА ВЫПУСКА

Шприц туба 300 мл.



ЭваВет

ТОО «ЭваВет»
ЗКО, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28Б
Телефон: 8 (711) 23-10-545
e-mail: evavetkaz@gmail.com